1. Непрямой массаж грудной клетки у новорожденного после родов начинаем проводить в соответствии с частотой пульса:
a. менее 80/мин.
b. менее 60/мин и более 160/мин.
c. менее 60/мин.
d. новорожденного без пульса не реанимируют

2. Соотношение компрессий грудной клетки: вдох и частота компрессий у новорожденных составляет:
a. как у младенцев в возрасте до 1 года
b. 3 компрессии: 1 вдох с частотой сокращений 120/мин.
c. 30 компрессий: 2 вдоха с частотой 100/мин.
d. как у детей в возрасте от 1 до 8 лет

3. Отметьте правильные утверждения:
a. перед началом сердечно-легочной реанимации необходимо обнажить грудную клетку пациента
b. судорожные агональные вдохи следует рассматривать как дыхание
c. реанимация взрослых начинается с компрессии грудной клетки
d. мидриаз и трупные пятна являются противопоказаниями для начала сердечно-легочной реанимации

4. У взрослых реанимация проводится по схеме:
a. 30 сжатий : 2 вдоха, 90 х в минуту
b. 5 начальных спасательных вдохов, затем 30 компрессий грудной клетки : 2 вдоха, 100 х в минуту
c. 30 сжатий : 2 вдоха, 100 х в минуту
d. прекардиальный удар, 5 вдохов, 30 сжатий : 2 вдоха

5. Отметьте правильные утверждения:
a. интубация трахеи не является обязательным условием для проведения расширенной сердечно-легочной реанимации
b. атропин при асистолии вводится всегда
c. интраосальный доступ не имеет приоритета над трахеальным введением лекарственных средств
d. кальций является неотъемлемой частью реанимации

6. Бронхоспазм при острой астме - приступ удушья возникает:
a. в результате спазма бронхов, гиперсекреции и отека слизистых оболочек
b. в результате атрофии цилиарного эпителия, обезвоживания слизистой оболочки бронхов
c. в результате повышения содержания CO2 в атмосфере
d. в результате миграции лимфоцитов в слизистую оболочку бронхов

7. Бессознательное состояние - это состояние, которое непосредственно угрожает жизни пострадавшего из-за:
a. опасности аспирации желудочного содержимого
b. нарушения функции клеток головного мозга
c. снижения температуры тела
d. острой печеночной недостаточности

8. Внезапное наступление потери сознания в течение секунды характерно для:

a. алкогольного опьянения
b. гипогликемии
c. алкогольного абстинентного синдрома
d. травмы черепа и головного мозга

9. При подозрении на гипогликемию в первую очередь необходимо:
a. введение глюкагона в мышцу
b. введение гипертонической глюкозы в вену
c. поддерживающее дыхание
d. изучение медицинской документации на предмет предшествующего заболевания

10. Спонтанное возвращение сознания без лечения не наступает в следующих случаях:
a. эпилептический припадок
b. фебрильные судороги
c. гипогликемия
d. спинальный шок

11. Распространенной причиной коллапса кроме всего прочего бывает:
a. лечение бета-блокаторами
b. передозировка кортикостероидами
c. чрезмерное употребление стимулирующих напитков
d. никотинизм

12. При внематочной беременности проводится дифференциальная диагностика относительно:
a. травмы головы
b. анафилаксии/аллергии
c. эмболии амниотической жидкостью
d. злоупотребления метамфетамином

13. При ситуативном повышении артериального давления вследствие возбуждения препаратом первого выбора является:
a. нитрат под язык
b. каптоприл под язык, внутривенно
c. седативное средство перорально, внутримышечно, внутривенно
d. ингибитор АПФ

14. Основой лечения гипертонической болезни с самого начала является:
a. немедленное лечение диуретиками и сосудорасширяющими средствами
b. изменение образа жизни (ограничение алкоголя, соли, увеличение физической нагрузки)
c. успокоение при сидячих профессиях
d. психотерапия

15. Наиболее распространенной причиной дыхательной недостаточности во внебольничных условиях является:
a. бронхиальная астма
b. высокая диафрагма
c. лечение опиоидными анальгетиками
d. перелом ребер

16. Расположение в соответствующем положении используют для:

a. облегчения беспокоящих симптомов
b. устранения этиологии заболевания
c. это позволяет оставить пациента без присмотра
d. психологической поддержки пациента

17. Золотые правила при оказании неотложной акушерской помощи таковы:
a. обеспечить подачу кислорода, расположив пациента на левом боку
b. думать о возможности внутреннего заболевания
c. попытаться помочь родить ребенка как можно раньше
d. положение лежа на спине для облегчения состояния

18. В случае преэклампсии - эклампсии - препаратами первого выбора являются:
a. спазмолитики, анальгетики
b. окситоцин, метилэргометрин
c. диазепам, $MgSO4$
d. опиоиды

19. Характерными признаками делирия являются:
a. внезапные качественные расстройства сознания и восприятия
b. расстройства памяти
c. агрессивность
d. плаксивость

20. Деменция не проявляется в виде:
a. прогрессирующего ухудшения психических функций
b. нарушения новой и старой памяти
c. сохраненной социальной адаптации индивидуума
d. гемипареза

21. При внезапных изменениях психического состояния после неудачных попыток договориться предпочтение отдается следующему:
a. антидепрессанты, нейролептики
b. предпочтение отдается антипсихотикам
c. гипнотики и седативные средства
d. физическое усмирение

22. Определите правильные положения в соответствии с конкретным состоянием:
a. положение полусидя при сердечной недостаточности и диспное
b. противошоковое положение в бессознательном состоянии для предотвращения аспирации
c. положение сидя при коллапсе и обезвоживании
d. положение на боку при потере объема крови

23. Отметьте неправильное утверждение:
a. транспортировка должна быть прежде всего быстрой
b. скорость транспортировки имеет преимущество только при предлежании плаценты
c. перед транспортировкой пациента следует стабилизировать или по крайней мере обеспечить его кровообращение и дыхание
d. у нестабильного пациента измеряют жизненно важные показатели в течение 20 минут

24. Ранение в результате воздействия ударной волны может быть:

a. первичное, вторичное, третичное, четвертичное
b. имитационное, ограниченное и существенное
c. острое, хроническое
d. барическое

25. Рабдомиолиз может возникать при:
a. передозировке наркотиками, после поражения электрическим током
b. регулярной физической активности без восстановления
c. длительном применении антибиотиков
d. после прекращения приема противозачаточных средств

26. Фармакологическое лечение рабдомиолиза заключается в следующем:
a. инфузионная нагрузка (fluid bolus), диуретики
b. прием альфамиметиков
c. инфузионная нагрузка (fluid bolus), ацидификация мочи
d. антитромботическая терапия

27. Основными причинами смертельных исходов от астмы, помимо недостаточно диагностированной и недостаточно леченной болезни, являются:
a. выраженный бронхоспазм с асфиксией, аритмии
b. аритмия после приема синтофиллина
c. сильное отрицательное давление в грудной клетке во время выдоха
d. увеличение венозного возврата

28. Какой из перечисленных ниже симптомов не является угрожающим жизни симптомом при острой астме:
a. брадикардия
b. гипертония
c. немая грудная клетка
d. бледность кожи

29. В лечении острой астмы они не являются самыми важными:
a. аминофиллин, магний
b. антигистаминные препараты, антибиотики
c. бетамиметики
d. антибиотики

30. Обозначение при сортировке пострадавших при массовом инциденте осуществляется с помощью цветных этикеток:
a. красная, оранжевая, зеленая
b. красная, желтая, зеленая, черная
c. синяя, белая, черная
d. красно-желтая, бело-голубая

31. Во время массового инцидента пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой перемещают:
a. v I порядке, красный цвет
b. во II порядке, желтый
c. не перемещают
d. транспортируют в морг

32. Для лечения легкой гипотермии в импровизированных условиях применяем:

a. агрессивный обогрев с помощью излучателя
b. промывание желудка теплым раствором
c. теплые напитки и энергетические продукты
d. купание в горячей воде

33. Для прогнозирования обморожения положительными признаками считаются следующие:
a. онемение пораженной части тела
b. волдыри с прозрачным содержимым
c. геморрагические волдыри
d. очевидная цветовая дифференциация участков обморожения от здоровых тканей

34. Фармакологическое лечение обморожений:
a. не существует никакого лечения, эффективность которого была бы доказана
b. низкомолекулярный гепарин уменьшает степень обморожения
c. профилактические антибиотики являются первой линией лечения
d. хирургическое иссечение

35. Возможность возникновения обморожения усиливается:
a. дегидратацией и гипоксией, курением, токсикоманией
b. гиперфункцией щитовидной железы
c. при неврологических заболеваниях
d. положительным семейным анамнезом

36. Какие осложнения не могут возникнуть при острых отравлениях различными веществами:
a. аспирационная пневмония
b. прекращение клеточного дыхания
c. облысение
d. онихомикоз

37. Какие специфические симптомы не характерны для интоксикации опиоидами и их производными:
a. миоз
b. фотофобия
c. брадипноэ
d. бледность слизистых оболочек

38. С точки зрения догоспитального лечения интоксикаций важным не является:
a. прекратить контакт с ядом
b. попытаться определить причину возникновения симптомов
c. информировать центр токсикологии о применении антидота
d. определять факт перенесения Covid 19

39. К антидотам при интоксикациях относят:
a. налоксон, атропин
b. синтостигмин, теофиллин
c. фуросемид
d. 5% глюкозы

40. Отметьте неверное утверждение:

a. лекарства от повышенного артериального давления не нужно принимать после 3-ох измерений с нормальными показателями АД
b. гипертония имеет типичные субъективные затруднения, которые пациент хорошо распознает
c. при любом чрезмерном повышении АД необходимо обратиться в службу скорой помощи
d. применение антигипертензивных препаратов не следует прекращать

41. Респирация состоит из нескольких фаз, отметьте правильные ответы:
a. вентиляция
b. экспирация
c. элиминация
d. экскреция

42. Перфузия в легких означает:
a. прохождение газов через альвеолокапиллярную мембрану
b. распределение дыхательной смеси в паренхиме легких
c. движение крови через легочную систему
d. соотношение потока газов и крови

43. Цели лечения дыхательной недостаточности на этапе догоспитального лечения не включают:
a. освобождение дыхательных путей
b. подачу кислорода при апноэ
c. контроль жизненно важных показателей
d. первичное и вторичное обследование

44. Симптомы шока, как правило, являются наиболее выраженными и типичными:
a. при черепно-мозговой травме
b. при кровотечениях, если пациент принимает бета-блокаторы
c. при уменьшении объема циркулирующей крови
d. при поперечных поражениях спинного мозга

45. Разница между геморрагическим и нейрогенным шоком заключается в:
a. гипертонии при травме спинного мозга
b. брадикардии при гиповолемии
c. гипотонии и брадикардии при травме спинного мозга
d. теплой периферии при геморрагическом шоке

46. Задействование вспомогательных дыхательных мышц:
a. означает паралич диафрагмы
b. указывает на грозящую респираторную инсуфициенцию
c. в любом случае увеличит поступление кислорода к тканям
d. является показателем бронхоспазма

47. Отметьте правильное утверждение:
a. артериальное давление измеряют преимущественно после еды и вечером
b. уровень сахара в крови при гипергликемии следует измерять с интервалом в одну минуту
c. глубокий вдох и выдох изменяют показатели артериального давления
d. манжета тонометра устанавливается на предплечье на уровне нижней полой вены

48. При острых сердечных заболеваниях в первую очередь следует установить:
a. точное начало возникновения стенокардии
b. продолжительность приема нездоровой пищи
c. количество черного кофе, выпитого за 24 часа
d. семейный анамнез сердечных заболеваний

49. Какие данные не имеют значения при дорожно-транспортном происшествии:
a. положение пострадавших на момент прибытия бригады
b. использование ремней безопасности, срабатывание подушек безопасности, степень деформации автомобиля
c. длина тормозного пути и следы заноса на дороге
d. количество пассажиров

50. Алгоритм ABCDE касается:
a. первичного обследования
b. вторичного обследования
c. неврологического обследования
d. анамнеза болевых ощущений